

四川政报

四川省人民政府办公厅关于加强斑潜蝇疫情监测防除工作的紧急通知

一九九七年八月七日 川办发〔1997〕102号

我省 1994 年首次发现美洲斑潜蝇之后, 1996 年 10 月又在攀枝花市、凉山州部分县(区)发现了拉美斑潜蝇。从当前情况看, 美洲斑潜蝇和拉美斑潜蝇(以下统称斑潜蝇)在我省已经混合发生, 特别是拉美斑潜蝇有进一步蔓延之势。当前, 正值斑潜蝇发生和危害的重要季节之一, 为确保全省 1200 多万亩蔬菜、花卉生产安全, 保障城乡人民生活的稳定, 特作如下紧急通知。

一、高度重视, 加强领导

两种斑潜蝇的寄主范围非常广泛, 对 8 科 42 种重要蔬菜作物及菊花科花卉进行危害。叶菜类蔬菜受害后丧失其食用价值; 瓜果类蔬菜受害后, 产量降低, 品质下降。受害作物一般减产 30 - 50%, 严重的毁种绝收。四川是我国重要的蔬菜产地。抓好斑潜蝇的防除工作, 促进蔬菜的安全生产, 不仅有利于“菜篮子”工程建设、平抑物价、稳定城乡人民生活, 而且还关系到农民的增收致富。各级政府要高度重视, 结合本地实际, 切实加强对斑潜蝇疫情监测和防除工作的组织领导, 统一组织、协调指挥, 在财力、物力上给予支持, 狠抓各项综合防治技术的落实, 确保疫情监测、控制和防除措施落到实处。

二、组织力量, 查清疫情

在疫情发生区, 要组织技术力量, 查清斑潜蝇的种类、分布、危害。同时, 要调查种群动态, 搞好测报, 指导防治。未发现疫情的地区, 也要在蔬菜集中种植区设立监测点, 坚持常年监测, 一旦发现疫情, 应立即采取措施, 消灭在零星发生阶段。各地要将监测、防除情况及时上报省农业厅。

三、严格检疫, 控制扩散

各级植物检疫机构要加强对蔬菜和花卉的检疫, 控制斑潜蝇疫情进一步扩散蔓延。严禁从疫区调出叶菜类蔬菜和花卉, 豆类、瓜类和果菜类蔬菜的调运不得带有藤蔓和叶片。植物检疫人员要有高度的责任感, 忠于职守, 严格执法, 严把检疫关。铁路、交通、邮电、航空、水路航运、工商和公安等部门, 要积极配合, 各负其责, 大力支持植物检疫部门的工作, 履行《植物检疫条例》和其它有关法律、法规所赋予的职责和义务, 共同把好检疫关, 防止斑潜蝇疫情通过运输途径扩散蔓延。

四、综合防治, 降低危害

各疫情发生区要根据斑潜蝇的发生特点, 在准确预报的基础上, 因地制宜, 采取销毁受害枝叶、水旱轮作、菜粮轮作、黄板诱杀和药剂防

治等综合技术措施,最大限度地降低斑潜蝇的危害,减少损失。各地要充分发挥农业植保部门社会化服务网络的作用,认真做好对路农药

的供应工作,指导农民科学用药,做到经济、安全、有效,提高防除效果。